Sclerosi multipla nei pazienti più anziani: Una popolazione di pazienti con esigenze specifiche

Prof. Gavin Giovannoni

Professore di Neurologia, Centre for Neuroscience, Surgery and Trauma, Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, Londra, Regno Unito

Esclusione di responsabilità

- *I prodotti non approvati o gli utilizzi non approvati dei prodotti approvati possono essere discussi dalla facoltà; queste situazioni possono riflettere lo stato di approvazione in una o più giurisdizioni*
- *La facoltà che si occupa della presentazione è stata informata da touchIME® affinché indichi eventuali riferimenti a utilizzi non etichettati o non approvati*
- *touchIME® non supporta in alcun modo prodotti non approvati o utilizzi non approvati né sottintende il proprio supporto ad essi qualora vi siano riferimenti a tali prodotti o utilizzi nelle attività di touchIME®*
- *touchIME® non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni*

Cosa sono l'immuno- e la neurosenescenza e che impatto hanno sui pazienti più anziani affetti da SM?

Biologia della senescenza¹⁻⁴

1. NIH, National Institute on Aging. Disponibile su: <https://permanent.fdlp.gov/gpo46777/biology-of-aging.pdf> (consultato a marzo 2021); 2. Calcinotto A, et al. *Physiol Rev.* 2019;99:1047-78; 3. Childs BG, et al. *Nat Med.* 2015;21:1424-35; 4. Morris BJ, et al. *Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis.* 2019;1865:1718-44.

I cambiamenti legati all'età interessano più sistemi¹⁻¹⁰

Sistemi

Nervoso
Linfatico/immunitario
Cardiovascolare
Endocrino
Muscolare
Digestivo
Riproduttivo
Dermatologico
Scheletrico

Potenziali cambiamenti

Atrofia cerebrale
Immunosenescenza
Aterosclerosi
Maggiore adiposità
Perdita di massa; debolezza
Maggiore sensibilità,
transito più lento
Menopausa/andropausa
Elastosi
Osteoporosi

L'immunosenescenza inizia relativamente presto¹⁻³

Neonato

10 anni

25 anni

50 anni

70 anni

Morfologia del timo

Schema istologico del lobulo timico

Anatomia

Cambiamenti funzionali

Il declino della funzione immunitaria inizia presto nel corso della vita, incrementa durante la mezza età e peggiora con l'invecchiamento

Un riepilogo dei principali cambiamenti del sistema immunitario dovuti all'immunosenescenza

Cellule colpite	Funzione compromessa dall'invecchiamento
Cellule NK	Eliminazione di cellule infettate/citotossicità Prodotti delle citochine
Neutrofili e monociti/macrofagi	Chemiotassi Eliminazione della funzione patogena/microbicida Fagocitosi Segnalazione TLR
Cellule dendritiche	Fagocitosi Presentazione dell'antigene
Cellule T	Cellule T inesperte ridotte (CD4 e CD8) Cellule T esperte nell'antigene aumentate (CD4 e CD8) Diversità delle cellule T ridotta
Cellule T e B CD4	Risposte degli anticorpi ad alta affinità
Cellule B	Cellule B inesperte ridotte Ricombinazione del cambio di classe, ipermutazione somatica Repertorio ridotto (ridotta risposta al neoantigene)

Immunosenescenza

L'invecchiamento e i cambiamenti nei linfociti provocati dalle TMM influenzano il rischio di LMP nei pazienti con SM

TMM	Casi di LMP	Età paziente (anni) con LMP
Natalizumab	763 in >181.300 pazienti	15–73
Fingolimod	19 in >225.000 pazienti	34–71
Dimetilfumarato	5 in >270.000 pazienti	54–66
Ocrelizumab	0 in >40.000 pazienti	
Teriflunomide	0 in >71.000 pazienti	
Alemtuzumab	0 in >18.400 pazienti	

Incidenza dell'herpes zoster ogni 1.000 anni paziente, su diversi trattamenti per SM^{1,2}

BID, due volte al dì; SM, sclerosi multipla.

1. Arvin AM, et al. *JAMA Neurol.* 2015;72:31-9; 2. Cook S, et al. *Mult Scler Relat Disord.* 2019;29:157-67.

Rischio maggiorato di neoplasie con l'invecchiamento

DISTRIBUZIONE PER ETÀ DEI NUOVI CASI DI TUMORE (TUTTI I TIPI) NELLA POPOLAZIONE GENERALE

L'avanzamento dell'età è il fattore di rischio più importante per i tumori in generale e per molte specifiche tipologie di tumore

COVID-19: considerare l'epidemiologia di questi fattori di rischio della popolazione generale

La maggior parte delle infezioni sono lievi

Fonti: China Center for Disease Control and Prevention; **N=44,672**

Gravità dei sintomi

Le persone ≥60 anni sono quelle più a rischio

Fonti: Portale italiano di epidemiologia per gli operatori sanitari, UK Office of National Statistics; **N=24,923**

Tasso di letalità (%) per fascia di età

Fragilità: i pazienti più anziani sono più vulnerabili ai danni polmonari, e complessivamente sono meno propensi a uno screening adeguato (ad es. a causa di una scarsa reazione alla febbre, demenza, ecc.)

COVID-19: considerare questi fattori di rischio – Epidemiologia Covisep nella popolazione SM

Studio di coorte
osservazionale,
multicentrico e
retrospettivo condotto
in centri specializzati in
SM e ospedali generali

347 pazienti (età media
[SD], 44,6 [12,8] anni,
249 donne; durata media
della malattia [SD], 13,5
[10,0] anni)

Gravità del COVID-19,
dati demografici,
anamnesi neurologica,
EDSS, comorbidità,
caratteristiche ed esiti
del COVID-19

Comorbidità	R ² cumulativo
EDSS	0,20
Età	0,26
Obesità	0,27

Variabilità cumulativa del COVID-19 grave

**In questa coorte SM, disabilità, età e obesità sono stati identificati
come principali fattori di rischio per la gravità del COVID-19**

Conclusioni

Il normale invecchiamento o la senescenza sono programmati

- Involuzione timica
- Diversità di repertorio ridotta
- Perdita di cellule T inesperte
- Proliferazione omeostatica non disciplinata
- Espansione clonale guidata da CMV ed EBV

Avvertenza sulla memoria di richiamo del vaccino

Reazione ridotta ai vaccini

Maggiore suscettibilità alle infezioni

Infezioni correlate all'età e infezioni opportunistiche

- Ad esempio, infezioni pneumococciche
- Ad esempio, LMP

Rischio aumentato di eventi avversi

- Infezioni
- Neoplasie secondarie

Riserva timica e di midollo osseo ridotta

Potenziale impatto sul trattamento della SM

- Fattore di progressione della malattia
- Risposta terapeutica ridotta alle TMM
- Comorbidità che interagiscono con le TMM

**Qual è il ruolo delle TMM
nei pazienti anziani con SM?**

L'invecchiamento è uno dei meccanismi alla base della progressione della SM^{1,2}

Perdita di volume cerebrale stimata usando SIENA/FSL: Volumetria cerebrale longitudinale negli adulti sani

L'invecchiamento è un fattore significativo che incide sul decorso della SM

1. Sanai SA, et al. *Mult Scler.* 2016;22:717–25; 2. Farber DL, et al. *Nat Rev Immunol.* 2014;14:24–35; 3. Thomas–Vaslin V, et al. In: Kapur S, Portela MB, Eds. *Immunosuppression – Role in Health and Diseases.* InTech. 2012; 4. Marrie RA, et al. *Neurology.* 2016 86:1279–86; 5. Goronzy JJ, Weyand CM. *Nat Immunol.* 2013;14:428–36; 6. National Multiple Sclerosis Society. Disponibile su: www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Who-Gets-MS (accesso a marzo 2021); 7. Multiple Sclerosis Association of America. Disponibile su: www.mymsaa.org/ms-information/faqs (accesso a marzo 2021); 8. Rovira A, et al. *Nat Rev Neurol.* 2015;11:471–82; 9. Bar–Or A, Antel JP. *Curr Opin Neurol.* 2016;29:381–87.

La lunghezza dei telomeri è associata con la progressione della disabilità nella SM

Natalizumab e recupero clinico dalle recidive

Percentuale di pazienti con incremento di $\geq 0,5$ punti (A) e $\geq 1,0$ punti (B) nel punteggio EDSS da pre-recidiva a recidiva (gravità della recidiva)

Siponimod vs placebo in SPMS (EXPAND): Studio di fase III randomizzato in doppio cieco

Meta-analisi dell'efficacia dipendente dall'età dei trattamenti per SM

Classificazione delle TMM per le forme recidivanti della SM

Classificazione delle TMM per le forme recidivanti della SM

L'esito timico genera un nuovo e diversificato repertorio TCR dopo l'ASCT nei pazienti con SM

Differenti approcci terapeutici all'uso delle TMM nel trattamento delle forme recidivanti di SM

Conclusioni

L'invecchiamento o la senescenza contribuiscono al peggioramento della SM

- Riduzione riserva cerebrale
- Invecchiamento precoce

I biomarcatori di senescenza sono associati all'invalidità correlata alla SM

L'attività della malattia correlata alla SM può accelerare l'invecchiamento

L'invecchiamento è associato a una risposta terapeutica ridotta alle TMM

Sebbene i principi di trattamento della SM siano simili nei pazienti giovani e anziani, occorre considerare altri fattori, ad es. la sicurezza, per l'adozione di una strategia terapeutica specifica o per la scelta di una TMM specifica

**Come cambierà la pratica nel prossimo futuro
per i pazienti anziani con SM?**

Soddisfare un'esigenza insoddisfatta: Una strategia terapeutica olistica

Meta-analisi dell'efficacia dipendente dall'età dei trattamenti per SM

Interruzione delle TMM nella SM

TMM in SM dopo un periodo prolungato senza recidive

Prima recidiva

Progressione confermata della disabilità

Incidenza della ricorrenza dell'attività della malattia dopo l'interruzione di fingolimod nei pazienti anziani

QUALI PAZIENTI sono colpiti da RDA?

Il 12,5% dei pazienti manifesta un rimbalzo dell'attività della malattia

QUALI PAZIENTI sperimentano un rimbalzo della malattia?

- Il **62,5%** dei pazienti precedentemente stabili in corso di trattamento
- Il **37,5%** dei pazienti non aveva TMM al momento del rimbalzo
- **Attività MRI** invece di recidive cliniche pre-FTY correlate con il rimbalzo della malattia

Differenti approcci terapeutici all'uso delle TMM nel trattamento delle forme recidivanti di SM

La cladribina orale è associata a una riduzione della conta dei linfociti

*Dati raccolti da CLARITY, CLARITY EXT e PREMIERE. **Grado 1: < livello normale inferiore (LLN)–800/mm³; grado 2: <800–500/mm³; grado 3: <500–200/mm³; grado 4: <200/mm³.
 Giovannoni G. *Neurotherapeutics*. 2017;14:874–87.

Soddisfare un'esigenza insoddisfatta: una strategia terapeutica olistica

La metformina ripristina la capacità di remielinazione del sistema nervoso centrale ringiovanendo le cellule staminali invecchiate

La comorbidità vascolare accelera la progressione della disabilità

Simvastatina a dosaggio elevato nella SPMS: sperimentazione MS-STAT

**BSI (Confine
Shift Integrale)**

Conclusioni

L'immunosenescenza è un aspetto naturale dell'invecchiamento e ha implicazioni nella gestione della SM

- Fermare e/o limitare i rischi delle TMM immunosoppressive
 - Rischio di rimbalzo o attività ricorrente della malattia
- Iper-farmacovigilanza
 - Infezioni e neoplasie secondarie
- Vaccinazione annuale

Approccio olistico al trattamento della SM

- Stile di vita e benessere, inclusa l'alimentazione
- Strategie anti-invecchiamento

Approccio propositivo allo screening e alla gestione delle comorbidità e altri fattori che influenzano gli esiti della SM

Urgente necessità di sviluppare una base di evidenze per gestire queste problematiche che emergono nella gestione della SM negli anziani