

Perspectivas interdisciplinarias sobre el tratamiento de la agitación en la demencia de Alzheimer

Aviso legal

- *El claustro puede analizar los productos no autorizados y los usos no autorizados de los productos autorizados. Estos casos pueden indicar el estado de autorización en una o más jurisdicciones*
- *El claustro encargado de la presentación ha recibido el asesoramiento de USF Health y touchIME para garantizar que divulguen las posibles recomendaciones realizadas para el uso no autorizado o no recogido en la ficha técnica*
- *Ni USF Health ni touchIME avalan los productos ni los usos no autorizados realizados o implícitos al hacer referencia a estos productos o usos en las actividades de USF Health o touchIME*
- *USF Health y touchIME no aceptan responsabilidad alguna por los posibles errores u omisiones*

Panel de expertos MDT



Prof. George T. Grossberg
Facultad de Medicina de la
Universidad de Saint Louis, St Louis,
MO, EE. UU.



Sra. Susan Scanland
Dementia Connection®
Clarks Summit,
PA, EE. UU.



Dr. Alireza Atri
Banner Sun Health Research
Institute, Sun City,
AZ, EE. UU.



Dra. Bonnie Burman
Ohio Council for Cognitive
Health, New Albany,
OH, EE. UU.

Agitación en la demencia de Alzheimer

Prevalencia¹



La agitación puede producirse en².....



Comportamientos^{2,3}

Agresividad

Actividad motora
no controlada

Inquietud

Deambulación

Angustia emocional

Uso de palabras
malsonantes

Movimientos repetitivos

Preguntas repetitivas



IMPACTO²

- Progresión acelerada de la enfermedad
- Deterioro de la salud física y mental
- Deterioro funcional
- Mayor riesgo de ingreso en un LTCF
- Baja calidad de vida


EA, enfermedad de Alzheimer; LTCF, centro de atención a largo plazo; DCL, deterioro cognitivo leve.

1. Van der Mussele S, et al. *Aging Ment Health*. 2015;19:247–57; 2. The Gerontological Society of America. Insights and Implications in Gerontology. Agosto de 2023.

Disponible en: <https://bit.ly/3HbJQyE> (último acceso el 6 de marzo de 2024); 3. Cummings J, et al. *Int Psycogeriatr*. 2015;27:7–17.

Definición de agitación en los trastornos cognitivos

Consenso de la Asociación Internacional de Psicogeriatría



*En circunstancias especiales, es posible que no se puedan documentar las conductas durante 2 semanas y pueden ser necesarias otras condiciones de persistencia y gravedad para captar el síndrome más allá de un único episodio.

1. Cummings J, et al. *Int Psychogeriatr.* 2015;27:7-17; 2. The Gerontological Society of America. Insights and Implications in Gerontology. Agosto de 2023.

Disponible en: <https://bit.ly/3HbIQyE> (último acceso el 6 de marzo de 2024).

Prevención y respuesta a la agitación

Prevención



Crear un entorno tranquilo



Evitar los desencadenantes ambientales



Vigilar la comodidad personal



Simplificar tareas y rutinas



Brindar la oportunidad de hacer ejercicio

Respuesta

Buscar una manera de dar salida a la energía de la persona



Intervenciones no farmacológicas

